


CLINIQUE DIAR SAADA

CENTRE DE RÉFÉRENCE DE LA CORRECTION DE LA VISION PAR LASER

DEOLLEMENT DE LA RETINE

Guide à l'usage des patients et de leur entourage



À chaque fois que nous nous développons
À chaque fois que nous évoluons et progressons
À chaque fois que nous contribuons pour une guérison
À chaque fois que nous accomplissons pour le patient un plus
Nous sommes dans la passion du devoir.

Le décollement de la rétine

Il correspond à une poche de liquide sous la rétine. Le décollement de la rétine est plus souvent provoqué par le développement d'une ou plusieurs déchirures rétiniennes.

Certaines conditions prédisposent au décollement de rétine : la myopie, la chirurgie de la cataracte, un traumatisme de l'œil, des antécédents de décollement de la rétine à l'autre œil, des antécédents familiaux de décollement de rétine.

Pourquoi opérer le décollement de la rétine ?

Parce que le traitement de la rétine décollée est seulement chirurgical. Le traitement par laser seul n'est pas possible à ce stade.

L'opération du décollement de la rétine représente un geste chirurgical majeur, car elle consiste à réappliquer la rétine décollée par l'une ou l'autre des méthodes décrites ci-dessous, diversement associées suivant le cas.

Clinique Diar Saada

100 Chemain Abdelkader El Mouradia ALGER

021698716 / 0770968887

Cliniquediarsaada@gmail.com

www.cliniquesaada.com

La chirurgie du décollement de la rétine

- Fermeture de la ou des déchirures en suturant un matériel synthétique sur la paroi externe de l'œil par action localisée et/ou circulaire (cerclage de l'œil).
- Cicatrisation des bords de la déchirure par application de froid (cryocoagulation), de chaud (diathermie, photocoagulation au laser).
- Fermeture de la ou des déchirures, dans certains cas par injection de gaz dans la cavité de l'œil.
- Ponction du liquide sous rétinien.
- Vitrectomie.
- Remplacement du corps vitré par gaz ou huile de silicone.
- Ablation du cristallin.

Pendant l'opération, le chirurgien peut à tout moment être amené à modifier son plan initial.

Anesthésie

L'œil peut être insensibilisé par des injections de voisinage ou des gouttes. Une anesthésie générale est également possible avec ses propres risques. L'anesthésie quelle qu'elle soit comporte des risques potentiels quelquefois imprévisibles dépendant surtout de l'état général des maladies chroniques (diabète, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, asthme, maladies cardiovasculaires et autres) et de l'âge avancé des patients.

Incidents et difficultés peropératoires

Ils sont rares et imprévisibles :

- Augmentation importante de la pression intra-oculaire.
- Hémorragie intra-oculaire.
- Incarcération de la rétine dans la ponction sclérale.
- Perforation ou rupture de la paroi externe de l'œil.
- Atteinte du cristallin.
- Arrêt circulatoire au niveau du nerf optique.
- Déchirure(s) rétinienne(s).

Les complications de l'opération du décollement de la rétine

Bien qu'elle soit parfaitement standardisée, l'opération de décollement de la rétine n'échappe pas à la règle générale selon laquelle il n'existe pas de chirurgie sans risque. Il n'est donc pas possible à votre ophtalmologiste de garantir formellement le succès de l'intervention.

Elles peuvent nécessiter une réintervention il s'agit :

- Augmentation importante de la pression intra-oculaire.
- Hémorragie intra-oculaire.
- Formation de nouvelles déchirures.
- Prolifération rétino-vitreuse qui aboutit à un plissement fixé de la rétine (cause sévère de récurrence du décollement de rétine).
- Prolifération d'une membrane épitréinienne maculaire.
- Altération de la macula.
- Intolérance au matériel suturé sur la paroi externe de l'œil.
- Nécrose de la paroi externe de l'œil avec proéminence de ce matériel sous la rétine.
- Infection intra-oculaire.
- Atrophie du nerf optique.